

Бутокс® 50
(розчин для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Прозора масляниста рідина світло-жовтого кольору з різким запахом. При змішуванні з водою утворює емульсію білого кольору.

Склад

100 мл препарату містять діючу речовину:

дельтаметрин - 5 г.

Допоміжні речовини: лимонна кислота, кальцію додецилфеніл сульфат, метоксипропанол ацетат, поліетоксилат три-тер-бутилфенол, ароматичний розчинник.

Фармакологічні властивості

АТС vet QP53F, інсектициди (QP53 FA03, дельтаметрин)

Діюча речовина препарату – дельтаметрин (група піретроїдів) ефективно діє при безпосередньому контакті на кліщів, вошей та мух, які паразитують на шкірі тварин. Механізм дії дельтаметрину полягає в активації натрієвих каналів мембран нервових клітин, незворотній деполаризації клітинних мембран і блокаді нервової провідності, що призводить до порушення рухових рефлексів, і в результаті чого настає повний параліч і загибель паразитів.

Застосування

Профілактика і лікування великої рогатої худоби і овець при ураженні ектопаразитами (кліщі, воші, волосоїди, мухи, гедзі, клопи, мошки):

велика рогата худоба: кліщі – *Psoroptes bovis*, *Sarcoptes bovis*; воші – *Linognathus vituli* (у телят);

вівці: кліщі – *Psoroptes ovis*, *Sarcoptes ovis*, воші – *Linognathus ovillus* і *L. pedalis*; рунець овечий – *Melophagus ovinus*.

Дозування

Застосовується лише зовнішньо.

| Захворювання | Обприскування, кількість Бутокса® 50, мл/100 л води | Купання, кількість Бутокса® 50, мл/100 л води | Кратність обробки |
|----------------------------|--|--|---|
| псороптоз, саркоптоз | 100 | 100-150 | 3 лікувальною метою – дворазово з інтервалом у 10 діб; з профілактичною метою – одноразово кожні 6 місяців |
| сифункулятоз, мелофагоз | 25 | 25-37,5 | Одноразово, повторна обробка залежить від рівня ураження паразитами |
| арахноентомози | 50 | 50-75 | Одноразова обробка захищає тварин впродовж 6 - 8 тижнів |

Обробку тварин проводять у суху погоду за температури не нижче 12 °С.

Купання тварин

Після очищення ванни для купання, попередньо готують необхідну кількість суміші Бутокса® 50 (у відповідності з дозуванням для купання). Розподіляють розчин по всьому об'єму ємності, потім перемішують протягом 10 хвилин. Щоб отримати готову емульсію, спочатку необхідно пропустити 20 тварин, які добре змішують емульсію в ємності. Після того, як тварини винесуть з ванни 10 % від загального обсягу робочої рідини, її доповнюють до вихідного рівня необхідною кількістю суміші Бутокса® 50 і води. Перших 20 тварин слід купати повторно. Перед обробкою тварини не повинні бути втомленими і не повинні хотіти пити. Проводити лікування в дуже жарку погоду не рекомендується. Після обробки 3 тисяч овець акарицидну рідину зливають у відстійні колодязі, не допускаючи попадання у водойми або річки. Ванну ретельно очищають від бруду і промивають водою, яку також зливають у відстійні колодязі.

Обприскування тварин

Перед застосуванням Бутокса® 50 необхідно попередньо розвести препарат у 1 літрі води, додати до суміші необхідну кількість води в резервуар для обприскування і ретельно перемішати. Під час кожного курсу лікування необхідно використовувати мінімум 3 літри розведеного продукту на тварину. Послідовність обприскування: вушні раковини, голова, тіло, хвіст, область навколо анального отвору, кінцівки. Особливу увагу, необхідно приділяти ураженим місцям.

Протипоказання

Препарат не застосовують ослабленим і виснаженим тваринам.

Застереження

Не змивати препарат. Не рекомендується обприскувати тварин проти вітру.

Після обробки тварин забій тварин на м'ясо дозволяється:

- велика рогата худоба – обмежень не має, вівці - 4 доби;
- молоко від корів – обмежень не має; молоко від овець - не можна вживати.

Всі роботи з Бутоксом® 50 проводять з використанням спецодягу (халат, прорезинені фартухи, головні убори, гумові чоботи, рукавиці, захисні окуляри, респіратор). Після закінчення роботи необхідно ретельно вимити водою з милом обличчя і руки, рот прополоскати. При випадковому попаданні розчину на шкіру або слизові оболонки його необхідно змити струменем води або зняти тампоном; при попаданні всередину - випити склянку теплої води з 2-3 таблетками активованого вугілля. При появі ознак отруєння (головокружіння, нудота, загальна слабкість) необхідно звернутися до лікаря.

Форма випуску

Флакони з алюмінію ємністю 250 мл або 1 л, закриті поліпропіленовими кришками. Може постачатися у картонних коробках по 12 флаконів в кожній.

Зберігання

Сухе, темне, недоступне для дітей місце, окремо від кормів і ділянок напування і годівлі тварин, при температурі не вище 25°C.

Термін придатності - 36 місяців.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Інтервет Інтернешнл Б.В.
Вім де Корверштраат, 35
5831 АН Боксmeer,
Нідерланди

Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat, 35
5831 AN Boxmeer,
The Netherlands

Назва та місцезнаходження виробника (виробників)

Інтервет Продакшнс С.А.,
Рю де Ліонс, 27460 Іговіль,
Франція

Intervet Productions S.A.,
Rue de Lyons, 27460 Igoville,
France